1.外科感染常见的化脓性致病菌有（ ）
A.葡萄球菌
B.链球菌
C.大肠杆菌
D.绿脓杆菌
E.以上都是

2.外科严重感染，较好的给药方法是（ ）
A.皮下注射
B.口服
C.肌肉注射
D.静脉注射
E.静脉滴注

3.冲洗治疗厌氧性感染的首选药物是（）
A.苯扎溴铵
B.生理盐水
C.3%过氧化氢
D.碘甘油
E.碳酸氢钠

4.下面不是外科感染中常见的化脓性致病菌的是（）
A.破伤风杆菌
B.葡萄球菌
C.链球菌
D.大肠杆菌
E.绿脓杆菌

5.伤后的时间短，创内有血液或血凝块创内轮廓能识别的是（ ）
A.新鲜创
B.陈旧创
C.无菌创
D.污染创
E.感染创

6.取第一愈合的是（ ）
A.陈旧创
B.褥伤
C.坏疽
D.化脓创
E.无菌手术创

好医学苑

7.创伤治疗的核心是（ ）
A.预防感染和制止感染
B.消炎
C.止痛
D.加强营养
E.提高饲料管理水平

8.处理烧伤原则是（ ）
A.镇痛
B.抗感染
C.防休克
D.治疗并发症
E.以上都是

9.临床上，可以用伍氏（wood’s）灯检查犬和猫的皮肤癣病，下列哪种微生物在伍氏（wood’s）灯检查下呈阳性是（ ）
A.犬小孢子菌
B.马拉色菌
C.须毛癣菌
D.链格孢霉
E.葡萄球菌

10.皮肤局部色质发生变化而皮肤表面凸起的是（ ）
A.斑
B.丘疹
C.肿瘤
D.脓疱
E.风疹

11.中耳炎常见的病原菌是（）
A、大肠杆菌和衣原体
B、大肠杆菌和链球菌
C、大肠杆菌和葡萄球菌
D、链球菌和葡萄球菌
E、链球菌和衣原体

12、发生于鼓室及耳咽管的炎症称（）
A、外耳炎
B、中耳炎
C、内耳炎
D、耳血肿
E、耳廓囊肿

开唐医学苑

13、中兽医称面神经麻痹为“歪嘴风”，主要见于（）
A、牛
B、羊
C、马
D、猪
E、犬

14、颈静脉注射氯化钙漏至颈静脉外,导致无菌性颈静脉周围炎,从而继发颈静脉炎，治疗时可局部注射（）
A、10%-20%硫酸钠液
B、氯化钠
C、葡萄糖
D、酒精
E、乳酸钠林格注射液

15、急性骨膜炎病初特征为（）
A、出血性浸润
B、结缔组织增生
C、急性浆液性浸润
D、粘液性浸润
E、胶冻样纤维素快

16、骨髓炎是骨组织 (包括骨髓、骨、骨膜)炎症的总称。临床上多见的是（）
A、非化脓性
B、化脓性
C、溃疡性
D、变性
E、坏死

17、不属于四肢骨骨折临诊特点的是（ ）
A、骨摩擦音
B、出血与肿胀
C、明显的全身反应
D、疼痛和机能障碍
E、肢体变形和活动异常

（18-19 题共用题干）
德国牧羊犬，2 岁，雄性，近 2 个月来在右肘头出现一鸡蛋大小的逐渐增大的波动性肿胀，无热无痛，未见明显跛行。

18、该肿胀最可能诊断是（ ）
A、血肿
B、关节炎
C、蜂窝织炎

好医学苦

D、淋巴外渗
E、黏液囊炎

19、根治方法是（）
A、热敷
B、引流
C、封闭
D、涂擦刺激剂
E、肿胀物摘除术

20、下列疾病中常反复发作的疾病是
A、肺炎
B、风湿病
C、胃肠异物
D、骨折
E、黏液囊肿

21、风湿病重常见的致病菌为
A、多杀性巴氏杆菌
B、幽门螺旋杆菌
C、石膏样小孢芽菌
D、溶血性链球菌
E、绿脓杆菌

22、风湿病是身体哪个部分的炎症( )
A、全身性结缔组织
B、局部结缔组织
C、肌肉组织
D、关节部位
E、脂肪组织

23、不主张使用磺胺类抗菌药物的疾病( )
A、风湿病
B、肺炎
C、肠炎
D、化脓性创面感染
E、眼科疾病

24、下列哪种疾病为幼年动物易发( )
A、肛门囊炎
B、直肠憩室
C、膀胱破裂
D、直肠破裂
E、直肠脱

好医学苑

25、犬肛门囊炎的症状不包括（　）
A、肛门明显肿胀、痉挛
B、排便困难,里急后重
C、肛门内流出鲜血
D、肛周脓肿
E、排泄瘘多在时钟 4 时和 8 时的位置上

26、直肠破裂的手术疗法不包括（ ）
A、直肠内单手缝合法
B、长柄全弯针缝合法
C、直肠缝合器缝合法
D、直肠半切除缝合法
E、人工直肠脱出术

27、仔猪肛门处向外突出的疾病是（ ）
A、肛门囊肿
B、会阴疝
C、锁肛
D、直肠脱
E、直肠憩室

28、由于游离于疝囊内的肠管，其中一部分又通过疝孔钻回腹腔，二者都受到疝孔的弹力压迫，造成血液循环障碍的疝称。（ ）
A、粘连性疝
B、可复性疝
C、粪性嵌闭疝
D、弹力性嵌闭疝
E、逆行性嵌闭疝

29、德牧犬　，5 月龄，近来腹底部出现直径 10CM 左右的肿胀，精神食欲无异常，麻醉后检查肿胀较柔软,有弹性，无波动，按压可缩小。该肿胀可初步诊断为。（ ）
A、脐疝
B、脐带炎
C、脐部肿瘤
D、脐部脓肿
E、脐部血肿

30、比熊犬，雌性，8 岁，7kg, 最近排粪困难，肛门两侧出现明显肿胀，触诊柔软，无热，无痛。手术治疗首选的维持麻醉药物是。（ ）
A、普鲁卡因
B、利多卡因
C、异氟醚
D、乙酰丙嗪
E、丁卡因

开源医学社

31、犬阴囊疝内容物常见的是。（ ）
A、前列腺
B、十二指肠区
C、膀胱
D、盲肠
E、空肠

32.角膜溃疡与穿孔使用贝复舒或素高捷疗眼药，禁止使用（ ）
A.盐水
B.蛋白银溶液
C.硫酸镁溶液
D.葡萄糖溶液
E.皮质类固醇

33.检眼镜主要用于检查（ ）
A.角膜
B.虹膜
C.玻璃体
D.视网膜
E.晶状体

34.闭合性气胸叩诊呈（ ）
A.清音
B.浊音
C.鼓音
D.实音
E.水平浊音

35.肠管部分切除时应缝合的方法是（ ）
A.断端吻合
B.连续缝合
C.库兴氏缝合
D.伦勃特缝合
E.间断缝合

36、巨结肠症多发生于直肠和（ ）
A.后段小肠
B.前段结肠
C.后段结肠
D.前段小肠
E.结肠盲端

好医学苑

37.角膜浅层炎症出现的是（ ）
A.树枝状新生血管
B.呈毛刷状
C.淡蓝色云雾状
D.薄的透明质
E.穿孔

38、手术刀的正确持握方法不包括一下哪一种（ ）
A、指压式
B、反挑式
C、全握式
D、全压式
E、执笔式

39.临床上最可靠、最常用的手术器械消毒方法是（ ）
A、煮沸灭菌法
B、高压蒸汽灭菌法
C、新吉尔灭浸泡消毒法
D、甲醛浸泡消毒法
E、酒精浸泡消毒法

40、用于呼吸骤停的急救药物是（）
A、肾上腺素
B、阿托品
C、硫酸镁
D、尼可刹米
E、丙泊酚

41.以下对软组织切开原则描述错误的是（）
A、靠近病变位置，直达术部
B、尽量避免损伤血管、神经、腺体等
C、腹部切开时，力求一次切开直达腹腔
D、逐层切开
E、创口整齐、大小适中

42、库兴式缝合常用于缝合（）
A、肝脏
B、肾脏
C、胃
D、肌肉
E、脾脏

好医学苑

43、2 月龄小猫蛔虫感染导致严重腹泻导致脱肛，临床检查可见 2cm 肠道垂脱于肛门往外，肠道呈粉红色，黏膜轻度水肿，经肠道整复后对肛门进行缝合，缝合方法为（）
A、荷包缝合
B、结节缝合
C、连续缝合
D、水平褥式内翻缝合
E、垂直褥式内翻缝合

44、使用利多卡因对牛进行硬膜外麻醉适宜的剂量是 ( )
A.5-10ML
B.10-15ML
C.20-30ML
D.30-40ML
E.55-60ML

45、全身麻醉前使用安定的目的是（）
A.减轻疼痛
B.消除恐惧
C.松弛肌肉
D.减少唾液分泌
E.较少麻醉用量

46、反应吸入麻醉药的麻醉可控性的指标是（）
A.血/气分配系数
B.终末吸气浓度
C.终末呼气浓度
D.最低有效血液浓度
E.最低有效肺泡浓度

47.奶牛 三岁 精神沉郁，体温升高，近期进食大量精料，存在指动脉亢进的情况，四肢置于腹下，该病最可能的诊断是（）
A.腐蹄病
B.蹄冠蜂窝组织炎
C.蹄叉腐烂
D.蹄叶炎
E.指间皮炎

48、3 岁柯基犬，误食主人的戒指导致严重呕吐，进行胃切开术，缝合时常用的方法是（）
A、浆膜肌层连续内翻缝合
B、浆膜肌层间断外翻缝合
C、胃壁全层连续内翻缝合
D、胃壁全层间断内翻缝合
E、全层水平纽扣缝合

好兽医学苑

49、对于消化系统的手术一般采取的缝合方式是什么（）
A、结节缝合
B、连续缝合
C、库兴氏缝合
D、康奈尔缝合
E、第一城连续缝合或结节缝合，第二层库兴氏缝合

50、开胸手术的缝合，将肋骨闭合时，应该将（）
A：肋骨后缘远端肌肉与下一肋骨后缘远端肌肉缝合
B：肋骨前缘近端肌肉与下一肋骨前缘远端肌肉缝合
C：肋骨前缘远端肌肉与下一肋骨后缘近端肌肉缝合
D：肋骨后缘近端肌肉与下一肋骨前缘近端肌肉缝合
E：肋骨骨膜与下一肋骨骨膜进行缝合

51、犬耳血肿手术如果施加了平行于切口的耳廓全层结节缝合，其目的是（）
A：止血
B：消除空腔，压迫血管
C：引流
D：闭合外耳手术切口
E：防止患犬抓挠

好兽医学苑